



Después de recibir una transfusión de sangre

Instrucciones para pacientes externos

Usted puede reiniciar sus actividades normales cuatro a seis horas después de la transfusión de sangre. Las reacciones a una transfusión de sangre pueden retrasarse.

- Si tiene fiebre con o sin escalofríos en las próximas 48 horas, es posible que se deba a una reacción retrasada a la transfusión.
- Si observa que su orina está oscura, tiene piel amarilla o se siente más cansado(a) que de costumbre durante las próximas dos semanas, usted podría estar teniendo una reacción retrasada a la transfusión.

Si usted cree que está teniendo una reacción retrasada a la transfusión, llame al personal de atención médica de inmediato.

Nombre: _____

No. Telefónico: _____



8/1/03

This information is prepared specifically for patients participating in clinical research at the Warren Grant Magnuson Clinical Center at the National Institutes of Health and is not necessarily applicable to individuals who are patients elsewhere. If you have questions about the information presented here, talk to a member of your healthcare team.

Questions about the Clinical Center? OCCC@cc.nih.gov

Where applicable, brand names of commercial products are provided only as illustrative examples of acceptable products, and do not imply endorsement by NIH; nor does the fact that a particular brand name product is not identified imply that such product is unsatisfactory.

National Institutes of Health
Warren Grant Magnuson Clinical Center
Bethesda, Maryland 20892